

ENSA-ALHOCEIMA
CP II.

ANALYSE 4
SEMESTRE 2

Exercice 1 :

1- Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_{-1}^2 x|x|dx \quad , \quad J = \int_{-1}^1 x|x|dx \quad , \quad K = \int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}} dx$$

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{1 - (\cos x)^2} dx \quad , \quad M = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - (\cos x)^2} dx. \quad N = \int_1^5 \left(x^2 + \frac{5}{x}\right) dx$$

$$O = \int_2^6 \frac{2x-1}{x^2-1} dx \quad , \quad P = \int_0^1 x\sqrt{x^2+4} dx \quad , \quad Q = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+1} dx$$

2- Calculer $J_a = \int_0^1 (x^2 - ax)^2 dx$ pour $a \in \mathbb{R}$.

Puis déterminer $\inf_{a \in \mathbb{R}} (J_a)$.

Exercice 2 :

Soient $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$.

1- Calculer $I + J$ et $I - J$

2- En déduire les valeurs de I et J.

Exercice 3 :

En utilisant un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_1^e \frac{3+\ln x}{(4+\ln x)^2} dx \quad , \quad J = \int_0^2 \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx \quad , \quad K = \int_0^4 \sqrt{x^2\sqrt{x}+x} dx$$

$$L = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{(\cos x)^3}{(2+\sin x)^2} dx \quad , \quad M = \int_{\ln 2}^0 \left(\frac{e^x+3e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\right) dx.$$

Pour M, on peut utiliser l'égalité : $\frac{t^2+3}{t(t^2+1)} = \frac{3}{t} - \frac{2t}{t^2+1}$

Exercice 4 :

Calculer les intégrales suivantes en utilisant une intégration par parties :

$$I = \int_1^a x^2 \ln x dx \quad \text{pour } a \geq 1 \quad , \quad J = \int_0^a x^2 \cos x dx \quad \text{pour } a \in \mathbb{R}.$$

$$K = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx \quad , \quad L = \int_0^a e^{\alpha x} \cos(\beta x) dx \quad \text{et } M = \int_0^a e^{\alpha x} \sin(\beta x) dx$$

Exercice 5 :

Soit : $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x^2} dx$, telle que $n \in \mathbb{N}^*$

1- Calculer I_1 .

2- Montrer que : $I_{n+2} = \frac{n+1}{2} I_n - \frac{1}{2e}$

Exercice 6 :

Soient m et n deux entiers relatifs tels que : $m \geq n$.

Calculer $\int_n^m E(x) dx$ ou $E(x)$ est la partie entière de x .

Exercice 7 :

Soient f et g deux fonctions définies sur $[a, b]$. f étant continue et g continue par morceaux positive.

Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$: $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$

Exercice 8 :

Soit $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $M = \sup_{x \in [-1, 1]} |f(x)|$.

Montrer que :

$$\left| \int_{-1}^1 (f(x) + x^2 f(-x)) dx \right| \leq \frac{8}{3} M$$

Exercice 8 :

1- Montrer que : $\lim_{u \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-u \sin x} dx = \frac{\pi}{2}$.

Utiliser l'encadrement : $\forall t \in [0, +\infty[: 0 \leq 1 - e^{-t} \leq t$.

2- Montrer que : $\lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{3u} \frac{\cos x}{x} dx = \ln 3$.

3- soit $C = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi} e^{-u \sin x} dx$

a- Montrer que : $\int_0^{\pi} e^{-u \sin x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-u \sin x} dx$.

b- Montrer que : $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] : \sin x \geq \frac{2x}{\pi}$.

c- En déduire que : $C = 0$.

4- Déterminer la limite : $D = \lim_{u \rightarrow +\infty} e^{-u^2} \int_0^u e^{x^2} dx$