

ENSA-ALHOCEIMA
CPII.

ANALYSE 4
SEMESTRE 4

Exercice 1

Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 \left(\int_0^x x^2 e^{xy} dy \right) dx, \quad J = \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dy \right) dx,$$

$$K = \int_1^a \left(\int_1^b xye^{x+y} dy \right) dx,$$

$$L = \iint x^2 \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy \quad \text{et} \quad M = \iint \frac{y}{1+x^2} dx dy$$

sur $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Exercice 2

1) Montrer que : $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{e^x \cos^2 y + e^{-x} \sin^2 y} dy = \text{Arctan}(e^{-x})$

2) En déduire que : $\int_{-2}^2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{e^x \cos^2 y + e^{-x} \sin^2 y} dy \right) dx = \pi$

Exercice 3

Calculer l'aire intérieure à la lemniscate d'équation polaire :

$$r = a \sqrt{\cos(2\theta)} \quad \text{ou} \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right] \quad \text{et} \quad a > 0. \quad \text{Voir figure 1.}$$

Exercice 4

Soit $R > 0$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq R^2\}$ et

$$\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq R, 0 \leq y \leq R\}$$

1) Calculer : $I(R) = \iint e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ sur D .

2) On pose : $J(R) = \iint e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ sur Δ .

Donner un encadrement de J à l'aide de I .

3) Montrer que la fonction : $R \mapsto \int_0^R e^{-x^2} dx$ admet une limite en $+\infty$ et donner la valeur de cette limite.

Exercice 5

1) Calculer l'aire du domaine limité par les paraboles :

$$y^2 = 3 - x \quad \text{et} \quad y^2 = 3 - 3x \quad \text{et} \quad x \geq 0.$$

2) Soit $a > 0$. Trouver l'aire du domaine extérieur au cercle d'équation polaire : $r = a$ et intérieur à la cardioïde d'équation polaire :

$$r = a(1 + \cos\theta). \quad \text{Voir figure 2.}$$

Exercice 6

1) Soient $a > 0$ et g une fonction de classe C^1 . Calculer $\int_0^a xg'(x)dx$.

2) Soient $a > 0$, $b > 0$, f une fonction de classe C^4 et

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq a \text{ et } 0 \leq y \leq b\}.$$

Calculer $\iint xy \frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y}(x, y) dx dy$ sur D .

Exercice 7

Calculer les intégrales triples suivantes :

1) $I = \iiint x^a y^b z^c dx dy dz$ sur

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \text{ et } 0 \leq z \leq xy\} \text{ avec } (a, b, c) \in (\mathbb{R}_+^*)^3.$$

2) $J = \iiint \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz$ sur

$$D = \{(x, y, z): x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \text{ et } x + y + z \leq 1\}$$

3) Calculer le volume du domaine :

$$D = \{(x, y, z): x \geq 0, y \geq 0, z \leq 5, x - y + z \geq 1 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Exercice 8

En utilisant un changement de variable convenable, calculer les intégrales triples suivantes :

1) $I = \iiint z^2 dx dy dz$ sur

$$D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2 \text{ et } 0 \leq z \leq h\}$$

2) $J = \iiint \left(\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \right) dx dy dz$ sur

$$D = \left\{ (x, y, z) : \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \leq 1 \right\} \text{ avec } (a, b, c) \in (\mathbb{R}_+^*)^3.$$

3) $K = \iiint |x^2 - y^2| dx dy dz$ sur

$$D = \{(x, y, z): x^2 + y^2 \leq z^2 \text{ et } 0 \leq z \leq 1\}$$




Figure 2




Figure 1